





Sociālo aprūpes centru skrīninga rezultāti

Publicēts: 07.01.2021.

Atjaunināts: 21.09.2021.

 [SAC skrīnings 28.12.2020. - 19.09.2021.](#) 

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem atbilstoši Veselības ministrijas noteiktajam algoritmam: <https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes>

Laboratoriskais skrīnings uz Covid-19 infekciju nav nepieciešams:

Personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju, nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu un izmeklēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju līdz simt astoņdesmit dienām pēc pirmā pozitīvā testa parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS10

Personām, kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju ar vakcīnu "Comirnaty" vai vakcīnu "Spikevax" (iepriekš –"COVID-19 Vaccine Moderna"), vai "COVID-19 Vaccine Janssen" nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu uz Covid-19 infekciju divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas. Tomēr minētajām personām ir ieteicams veikt izmeklējumu uz Covid-19 infekciju pēc epidemioloģiskajām indikācijām (piem., pēc augsta inficēšanās riska kontakta ar Covid-19 pacientu vai strādājot Covid-19 uzliesmojuma skartajā ārstniecības iestādes struktūrvienībā)

Personām, kuras tiek vakcinētas pret Covid-19 ar vakcīnu "COVID-19 Vaccine AstraZeneca" rutīnas skrīnings un izmeklēšana pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju turpinās līdz 21. dienai pēc pirmās devas saņemšanas un pēc 90. dienas, ja nav saņemta otrā pote. Pēc vakcīnas 2. devas saņemšanas izmeklējumu uz Covid-19 infekciju veic pēc epidemioloģiskajām indikācijām

Personām, kuras ir saņēmušas vienu vakcīnas "Comirnaty", vakcīnas "Spikevax" (iepriekš –"COVID-19 Vaccine Moderna"), vakcīnas "COVID-19 Vaccine Janssen" vai vakcīnas "COVID-19 Vaccine AstraZeneca" devu 180 dienu laikā kopš laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu uz Covid-19 infekciju divas nedēļas pēc vakcinācijas.

Sociālās aprūpes centrs seko skrīninga pakļauto personu veselības situācijai, proti, vai tā ir pārslimojusi COVID-19 un līdz ar to nav pakļauta skrīningam noteiktu laiku, vai arī cik tālu persona tikusi vakcinēšanās procesā.

Rutīnas skrīninga un Slimību profilakses un kontroles centra pieteiktās testēšanas rezultāti sociālajās aprūpes iestādēs tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē [katru nedēļu](#).

leteikumi ārstniecības iestādēm